

檢查前預備

- 敬請準時到達。
- 如需改期或取消預約，請在檢查前一個工作天於服務時間內通知本中心職員。
- 18 歲或以下病人需要由家長或親人陪同進行檢查，同意書必須由父母或法定監護人簽署。

飲食及活動

- 接受造影劑之病人，須禁食至少 4 小時。期間可飲用清水。可照常以清水服用有需要之處方藥物。

心臟血管造影

- 請繼續服用 beta-blocker 和血壓藥物，或遵照醫生指示。
- 檢查前 12 小時內停止飲用含咖啡因或茶等刺激性成份飲品。
- 心律不整可影響心血管造影的準確性。
- 醫生或有需要處方藥物以減慢病人心跳，以獲得理想心臟血管電腦掃描影像質素，亦可減低輻射劑量。

衣著

- 請穿著寬鬆舒適衣物，避免有拉鏈、金屬鈕扣或飾物。
- 有需要時本中心會提供掃描服以供替換。

病歷紀錄

- 接受造影劑檢查之病人，而其年齡介乎 60 歲或以上 / 糖尿病患者 / 腎病患者 / 服用血壓藥物人士，需提供最近 3 個月內的腎功能指數 (Serum Creatinine)。
- 如曾經對食物、藥物或造影劑有過敏反應，請盡早通知主診醫生及本中心職員。
- 請攜同與病歷相關之檢查報告，包括抽血、化驗、掃描報告及影像等，以供參考。

糖尿病患者須知

- 糖尿病患者請於檢查前通知本中心。
- 於禁食期間請停服糖尿病藥物，並隨身帶備有關藥物。檢查完成後可回復正常飲食及糖尿病藥物。
- 如有服用 Metformin「甲福明」之糖尿病及嚴重腎衰竭患者，我們會按情況建議您於注射造影劑後 48 小時內暫停服用 Metformin「甲福明」類別之糖尿病藥物。以及按指示抽血檢驗腎功能指數後，方可續用 Metformin「甲福明」。詳情請向主診醫生查詢。

檢查程序

- 若閣下有下列情況：懷疑懷孕或患有幽閉恐懼症，請盡早通知主診醫生並於檢查前一個工作天聯絡本中心職員以確定是否需要延後檢查。如有需要，本中心會為您進行小便驗孕測試。
- 整個檢查過程包括以下程序：
 - 護理人員會索取您的病歷。
 - 接受造影劑之病人，護理人員會向您解釋注射造影劑之有關風險。您須要簽署注射造影劑同意書。
 - 於適合位置上置放靜脈注射造口，用於注射造影劑。
 - 檢查完成及除去靜脈注射造口後休息至少 10 分鐘，無任何不適，便可離開。
- 本中心將收取與掃描檢查有關之藥物及化驗費用。

掃描完成後

- 可回復正常飲食及多喝水或其他飲料。
- 掃描完成後沒有活動限制。

注意事項

- 若天文台懸掛黑色暴雨警告、八號或以上颱風訊號、或超強颱風後引致「極端情況」，檢查將會取消。本中心會於辦公時間內與您聯絡及安排。

免責聲明

- 本單張只提供有關程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

